

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
БАКТЕРИОФАГ СТАФИЛОКОККОВЫЙ ЖИДКИЙ "MediPhag"
BACTERIOPHAGE STAPHYLOCOCCAL LIQUID "MediPhag"**

«УТВЕРЖДЕНО»
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Главное управление по контролю
качества лекарственных средств и
медицинской техники
3.10.2016г. №19

Торговое название препарата: Стафилококковый бактериофаг жидкий "MediPhag"

Международное непатентованное название: Стафилококковый бактериофаг Bacteriophage staphylococcal

Лекарственная форма: препарат представляет собой прозрачную жидкость жёлтого цвета различной интенсивности, 5 флакона по 10 мл, 4 флакона по 20 мл, и 1 флакон по 100 мл или 1 флакон с 20 мл препаратом, с крышкой дозатором-распылителем (спрей) в картонной коробке.

Состав препарата:

1 мл препарата содержит:

активные вещества: стерильно очищенный фильтрат фаголизатов бактерий *Staphylococcus aureus*, не менее 1×10^6 КОЕ/мл.

вспомогательные вещества: консервант, хинозол 0,00001 г/мл или 0,001% от объема жидкого фага, вода очищенная.

Описание: прозрачная жидкость желтого цвета различной интенсивности.

Фармакотерапевтическая группа: бактериофаг стафилококковый – иммунобиологический препарат, является специфическим вирусом, который избирательно лизирует *Staphylococcus*.

Фармакологические свойства

Стафилококковый бактериофаг – лекарственный препарат, обладающий специфическим бактерицидным действием в отношении штаммов стафилококков, наиболее значимых в этиологии гнойных и воспалительных заболеваний. Бактериофаг специфически лизирует бактерии *Staphylococcus*. Фаговые частицы прикрепляются к мембране чувствительных бактерий, проникают внутрь клетки и размножаются за счет её ресурсов. Вследствие этого происходит гибель клетки и выход зрелых вирулентных фаговых частиц, способных к заражению других чувствительных бактериальных клеток. Бактериофаг стафилококковый не влияет на другие бактерии, в частности не нарушает естественную микрофлору.

Показания к применению

Препарат применяется для лечения и профилактики, бактериальных гнойно-воспалительных заболеваний обусловленных *Staphylococcus aureus* во всех возрастных и высокого риска группах.

Лечение:

- хирургические инфекции: гнойная рана, ожог, абсцесс, флегмона, фурункул, карбункул. Гидраденит, панариций, парaproктит, мастит, бурсит и остеомиелит.
- урогенитальные инфекции: уретрит, цистит, пиелонефрит, колпит, эндометрит и сальпингооофрит.
- гастроэнтерологические заболевания: энтероколит, холецистит, синдром раздраженного кишечника (СРК), дисбактериоз.
- бактериальные инфекции верхних дыхательных путей: воспаления пазух носа и среднего уха, ангина, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония и плеврит.

Профилактика:

- обработка свежих ран.
- гнойных осложнений при хирургических манипуляциях и операциях.
- бактериальных осложнений при острых респираторно-вирусных заболеваниях.
- сепсиса и энтероколита у новорожденных детей при внутриутробном инфицировании.
- бактериального загрязнения и внутрибольничных инфекций в лечебных заведениях.

Способ применения и дозы

Важным условием эффективной фаготерапии является предварительное определение фагочувствительности возбудителя заболевания (определение чувствительности к стафилококковому бактериофагу штаммов, выделенных от больного). Применение стафилококкового бактериофага является наиболее эффективным на раннем этапе заболевания, а также его введение в самый очаг инфекции. С учетом локализации очага инфекции препарат Стафилококковый бактериофаг жидкий может применяться:

- местно** – в виде орошений, промываний, полосканий, закапываний, аппликаций, тампонов, турунд.
 - Путем введения внутрь полостей (брюшную, плевральную, суставную, мочевого пузыря) через капиллярный дренаж, катетер;
 - путем приема внутрь (per os):** путем введения в прямую кишку (per rectum) с помощью клизмы.
- Стафилококковый бактериофаг жидкий назначают одновременно как местно, так для приема внутрь (per os). Длительность курса лечения препаратом от 5 до 10 дней. Доза препарата определяется характером очага инфекции и составляют: до 200 мл (с учетом размеров пораженного участка) – для орошений, примочек, тампонов; до 100 мл – для введения внутрь полости (плевральная, суставная и другие ограниченные полости) вводят через капиллярный дренаж. Затем полость наглухо зашивают или оставляют капиллярный дренаж, через который в течение нескольких дней повторно вводят бактериофаг.
1. При абсцессах препарат вводят в полость очага после удаления гноя с помощью пункции. Количество вводимого препарата должно быть несколько меньше объема удаленного гноя. Гной может быть удален путем вскрытия абсцесса с последующим введением в полость тампона, обильно смоченного бактериофагом.
 - 10-20 мл – для вливания в рану при остеомиелите (после соответствующей хирургической обработки).
 - 2-10 мл – для орошений, полосканий, промываний, закапываний, смачивания турунд при гнойно-воспалительных заболеваниях уха, горла, носа. Процедуру проводят 1-3 раза в день (турунды оставляют на 1 ч). Детям в возрасте до 11 лет миндалина целесообразно обрабатывать с помощью шприца (или воспользоваться спреем) и закапывать препарат в нос – для обработки задней поверхности глотки; дети старшего возраста могут полоскать зев и закапывать небольшое количество (2 мл) препарата в нос.
 2. При циститах, пиелонефритах, уретритах препарат принимают внутрь. В случае если полость мочевого пузыря или почечной лоханки дренированы, бактериофаг вводят через катетер или зонд 2 раза в день по 20-30 мл в мочевой пузырь и по 10 мл почечную лоханку.
 3. При энтеральной патологии, СРК (дисбактериоз) вызванные микроорганизмами *Staphylococcus aureus* Стафилококковый бактериофаг жидкий применяется внутрь и в виде клизм. Препарат принимают натощак за 1-1,5 час до еды. В виде клизм назначается 1 раз в день, вечером, перед сном, после опорожнения кишечника.

Рекомендуемые дозировки препарата:

	Возраст	Внутрь (per os)	Клизма (per rectum)
1	До 6 месяцев	5 мл на один приём 1 раза в день, в течение 5-7 дней	10 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
2	От 6 до 12 месяцев	5 мл на один приём 2 раза в день, в течение 5-7 дней	10 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
3	От 1 года до 3 лет	5 мл на один приём 3 раза в день, в течение 5-7 дней	20 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
4	От 3 лет до 8 лет	10 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 5-7 дней	30 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
5	Выше 8 лет	20 мл на один приём 2-3 раза в день, в течение 5-7 дней	40 – 50 мл один раз в день, в течение 5-7 дней

Возраст	Внутрь (per os)	Клизма (per rectum)
1	До 6 месяцев	10 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
2	От 6 до 12 месяцев	10 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
3	От 1 года до 3 лет	20 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
4	От 3 лет до 8 лет	30 мл один раз в день, в течение 5-7 дней
5	Выше 8 лет	40 – 50 мл один раз в день, в течение 5-7 дней

Бактериофаг стафилококковый в форме спрей применяют с лечебной и профилактической целью в виде орошения инфицированных стафилококком кожных покровов и слизистых оболочек при ожогах, гнойно-воспалительных заболеваниях, инфицированных ранах, при ангине.

Побочные действия

Препарат нетоксичен. Какие либо побочные явления не обнаружены.

Противопоказания

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Лекарственные взаимодействия

Препарат можно применять совместно с препаратами любой группы.

Особые указания

Начинать лечение бактериофагом следует как можно раньше. Перед использованием препарат необходимо взболтать.

Мутный препарат применению не подлежит:

Если до применения бактериофага для обработки раны использовались химические антисептики, рану необходимо тщательно промыть стерильным 0,9% раствором натрия хлорида.

Поскольку в препарате содержится питательная среда, в которой могут развиваться бактерии из окружающей среды, при вскрытии флакона, отборе и хранении должны соблюдать следующие правила:

- руки следует тщательно вымыть;
- перед тем как снять колпачок с флакона, его следует обработать раствором спирта;
- колпачок следует снимать, не вынимая пробку;
- препарат из вскрытого флакона следует отбирать стерильным шприцом (путем прокола пробки);
- если при вскрытии флакона вместе колпачком была изъята пробка, флакон не следует оставлять открытым;
- вскрытый флакон необходимо хранить в холодильнике. Допускается применение содержимого флакона в течение 24 часов после вскрытия, при хранении в соответствующих условиях.
- при пользовании спреем, флакон держать вертикально крышкой вверх и направить распылитель в обрабатываемую поверхность.

Беременность и период лактации.

Бактериофаг можно применять в период беременности и лактации.

Передозировка

Данные о передозировке не описаны.

Форма выпуска

5 флакона по 10 мл, 4 флакона по 20 мл, и 1 флакон 100 мл, или 1 флакон 20 мл, препаратом с крышкой дозатором-распылителем (спрей), в картонной коробке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языке.

Условия хранения

Хранить в сухом, темном месте при температуре от +2 до +15°С. Препарат хранить в недоступном для детей месте и не следует его использовать после истечения срока годности.

Срок годности

2 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель:

ООО «AZIYA IMMUNOPREPARAT»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусобадский район 17 кв. промышленная зона, северная часть, участок №2. Телефон +998712209144.

КУЛЛАШ БЎЙИЧА ЙЎРИҚНОМА
СТАФИЛОКОК СУЮҚ БАКТЕРИОФАГИ «MediPhag»
BACTERIOPHAGE STAPHYLOCOCCAL LIQUID «MediPhag»

«ТАСДИҚЛАНГАН»
 ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
 СОғЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
 Дори воситалари ва тиббий техника
 сифатини назорат қилиш Бюро бошқармаси
 3.10.2016г. №19

Препаратнинг саудо номи: Стафилококк суяқ бактериофаги «MediPhag»

Халқаро патентланмаган номи: Стафилококк бактериофаги

Bacteriophage staphylococcal

Дори шакли: препарат турли жадалликдаги сариқ рангли, тиниқ суяқлик. 10 мл дан 5 флакон, 20 мл дан 4 флакон ва 100 мл дан 1 флакон ёки 20 мл дан 1 флакон дозатор-пуркагичли қопқоқ (спрей) билан, картон қутида.

Препаратнинг таркиби:

1 мл препарат қуйидагиларни сақлайди:

фаол моддалар: Staphylococcus aureus бактериялари фаголизатларининг стерил тозаланган фильтрати, камида 1x10¹⁰ КОЕ/мл.

ёрдамчи моддалар: консервант, хинозол 0,00001 г/мл ёки суяқ фаг хажмининг 0,001%. Тозаланган суя.

Таърифи: турли жадалликдаги сариқ рангли тиниқ суяқлик.

Фармакотерапевтик гуруҳи: Иммунобиологик препарат – стафилококк бактериофаги, бактерияларнинг специфик вируслари бўлиб, улар Staphylococcus aureus микробларини лизис қилади.

Фармакологик хусусиятлари

Стафилококк бактериофаги – йирингли ва яллиғланиш касалликларининг этиологиясида энг муҳим аҳамиятга эга бўлган стафилококкларнинг штаммларига нисбатан специфик бактерицид таъсирга эга бўлган дори препаратидир. Бактериофаг Staphylococcus бактерияларини специфик лизисга уchrатади. Фаг зарралари сезгир бактерияларнинг мембранасига ёпишади, хужайра ичига кирди ва унинг ресурслари ҳисобига кўпаяди. Бунинг оқибатида хужайра нобуд бўлади ва бошқа сезгир бактерия хужайраларни зарарлаш қобилиятига эга этилган вирулент фаг қисмларини ажралиб чиқариш кузатилади. Стафилококк бактериофаги бошқа хужайраларга таъсир кўрсатмайди, хусусан табиий микрофлора ни бузмайди.

Қўлланилиши

Препарат берча ёшдаги ва юқори ҳавф гуруҳдагиларда Staphylococcus aureus томонидан қақирилган бактериал йирингли-яллиғланиш касалликларини даволаш ва олдини олиш учун қўлланади.

Қуйидагиларни даволаш:

- жаррохлик инфекциялари: йирингли яра, қуйиш, абсцесс, флегмона, фурункул, карбонкул, гидраденит, панариций, парапроктит, мастит, эндометрит, остеомиелит.
- урогенитал инфекциялар: уретрит, цистит, пиелонефрит, кольпит, андрометрит ва салгинитлар.
- гастроэнтерологик касалликлар: энтероколит, холецистит, таъсирланган ичак синдроми (ТИС), дисбактериоз.
- юқори нафас йўллариининг бактериал инфекциялари: бурун бўшлиқлари ва ўрта қулоқни яллиғланиши, ангина, фарингит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония ва плевритни даволаш учун қўлланилади.

Профилактика:

- янги жароҳатларга ишлов беришда.
- жаррохлик муолажалари ва операциялардаги йирингли асоратларида.
- ўткир респиратор-вирусли касалликларда бактериал асоратларида.
- она қорнида инфекцияланган, янги тутилган чақалоқлардаги сепсис ва энтероколитда.
- даволаш муассасаларида бактериал инфлюэнца ва касалхона ички инфекцияларини профилактикасида қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари

Самарали фаготерапиянинг муҳим шарти бўлиб, дастлаб касаллик кўзгатувчисининг фагосезувчанлигини аниқлаш (бемордан ажратиб олинган штаммларнинг стафилококк бактериофагига сезувчанлигини аниқлаш) ҳисобланади. Стафилококк бактериофагини касалликнинг илк босқичида қўллаш, шунингдек уни инфекция юбориш энг самарали ҳисобланади. Инфекция ўчоғини жойлашишга қараб, суяқ стафилококк бактериофаги:

маҳаллий – чайиш, ювиш, томизиш, аппликациялар, тампонлар, турундалар кўринишида. Капилляр дренаж, катетер орқали бўшлиқлар (қорин, плевра, бўғим, қовуқ) ичига юбориш йўли орқали;

ичга қабул қилиш (per os) йўли орқали; клизма ёрдамида тўғри ичкака (per rectum) юбориш мумкин. Маҳаллий шикастланиш билан кечувчи йирингли-яллиғланиш касалликларини даволаш учун суяқ стафилококк бактериофаги ҳам маҳаллий, ҳам ичга қабул қилиш (per os) учун буюрилади. Препарат билан даволаш курси давомийлиги 5 кундан 10 кунгача. Препаратнинг дозаси инфекция ўчоғининг характери билан белгиланади ва қуйидагиларни ташкил этади: 200 мл гача (шикастланган ўчоғининг ўлчамини ҳисобга олиб) – чайиш, намлаш, тампонлар; 100 мл гача – бўшлиқлар (плеврал, бўғим ва бошқа чегараланган бўшлиқлар) ичига юбориш учун капилляр дренаж орқали юборилади. Сўнгра бўшлиқ тўлиқ тикилади ёки капилляр дренаж қолдирилади, у орқали бир неча кун давомида бактериофаг тақроран юборилади.

1. Абсцессларда пункция ёрдамида йиринг олиб ташлангандан кейин препарат ўчоқ бўшлиғига юборилади. Юборилмаётган препаратнинг микдори олиб ташланган йирингнинг хажимидан бироз кам бўлиши керак. Йиринг абсцессни очиб йўли билан олиб ташланиши мумкин, кейинчалик бактериофаг билан намланган тампон бўшлиққа қўйилади.

2-10 мл – остеомиелитда араларга юбориш учун (тегишли жаррохлик ишловидан кейин) қўлланилади.

2-10 мл – қулоқ, томоқ, буруннинг йирингли-яллиғланиш касалликларида чайиш, ювиш, томизиш, турундаларни намлаш учун қўлланилади. Муолажа кунига 1-3 марта ўтказилади (турунда 1 соатга қолдирилади), 11 ёшгача булган болаларда бодомсимон безларга шприц (ёки спрей) ёрдамида ишлов бериш ва ҳалқумнинг орқа соҳасига ишлов бериш учун препаратни бурунга томизган афзал; катта ёшдаги болалар томоғни чайишлари ва препаратнинг оз микдорини (2 мл) бурунга томизишлари мумкин.

2. Цистит, пиелонефрит, уретритларда препарат ичга қабул қилинади. Агар қовуқ ёки буйрак жоми дренажланган бўлса, бактериофаг катетер ёки зонд орқали 20-30 мл дан қовуққа ва 10 мл дан буйрак жомига кунига 2 марта юборилади.

3. Staphylococcus aureus микроорганизми томонидан қақирилган энтерал патологияда, ТИС (дисбактериоз) да суяқ стафилококк бактериофаги ичга ва клизма кўринишида қўлланади. Препарат оғвқдан 1-1.5 соат олдин о қорнига қабул қилинади. Клизма кўринишида кунига 1 марта, кечкурун, уйқудан олдин, ичак бушаганидан кейин буюрилади.

Препаратнинг тавсия этилган дозалари:

	Ёш	Ичга (per os)	Клизма (per rectum)
1	6 ойликкагача	5 мл бир марта қабул қилиш учун, кунига 1 марта, 5-7 кун	10 мл кунига бир марта, 5-7 кун
2	6 ойликдан 12 ойликкагача	5 мл бир марта қабул қилиш учун, кунига 2 марта, 5-7 кун	10 мл кунига бир марта, 5-7 кун
3	1 ёшдан 3 ёшгача	5 мл бир марта қабул қилиш учун, кунига 3 марта, 5-7 кун	20 мл кунига бир марта, 5-7 кун
4	3 ёшдан 8 ёшгача	10 мл бир марта қабул қилиш учун, кунига 2-3 марта, 5-7 кун	30 мл кунига бир марта, 5-7 кун
5	8 ёшдан ошганлар	20 мл бир марта қабул қилиш учун, кунига 2-3 марта, 5-7 кун	40-50 мл кунига бир марта, 5-7 кун

Пуркагич (спрей) кўринишидаги бактериофаг даволаш ва профилактика мақсадида стафилококк билан зарарланган тери ҳаватига, шиллик пардаларга, қуйган соҳага, йирингли яраларга ишлов беришда ва ангинадда ишлатилади.

Ножўя таъсирлари

Препарат захарли эмас. Бирон-бир ножўя таъсири аниқланмаган. Сезувчан пациентларда аллергия реакциялар бўлиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Препаратни бирон-бир компонентига ўта юқори сезувчанлик булганда.

Дориларнинг ўзаро таъсири

Препаратни ҳар қандай гуруҳдаги дори воситалари билан бирга қўллаш мумкин.

Махсус кўрсатмалар

Бактериофаг билан даволашни иложи борича эрта бошлаш керак. Препаратни қўллашдан олдин чайқатиш керак. **Хира препаратни ишлатиш мумкин эмас.** Агар бактериофагини қўллашдан олдин ярага ишлов бериш учун кимёвий антисептиклар ишлатилган бўлса, у ҳолда ярани 0,9% ли натрий хлориднинг стерил эритмаси билан яхшилаб ювиш керак. Препарат атроф - муҳитдаги бактериялар ривожланиши мумкин булган озуқа муҳитини сақлайди. Шу сабабли, флакон очилганда, препарат олинганда ва сақланганда қуйидаги қоидаларга риоя қилиниш керак:

- Қўлларни яхшилаб ювиш керак;
- Флакон қалпоқчасини очилдан олдин уни спирт эритмаси билан ишлов бериш керак;
- Қалпоқчани тижинни олмасдан очиш керак;
- Очилган флакондаги препаратни стерил шприц ёрдамида (тижинни тешиш орқали) олиш керак;
- Агар флаконни очилда қалпоқча билан бирга тижин ҳам чиққан бўлса, флаконни ёчиқ қолдириш мумкин эмас;
- Очилган флаконни соғутичда сақлаш керак. Тегишли шароитларда сақлаганда флакон очилгандан кейин 24 соат давомида препаратни ишлатишга йўл қўйилади.
- Спрейдан фойдаланилганда флаконни қалпоқчаси билан юқорига қаратилган вертикал ҳолатда ва пуркагич ишлов берилаётган юзга қаратилган ҳолатда ушлаш керак.

Ҳомиладорлик ва лактация даври

Бактериофагини ҳомиладорлик ва лактация даврида қўллаш мумкин.

Дозани ошириб юборилиши

Дозани ошириб юборилиши тўғрисида маълумотлар таърифланмаган.

Чиқарилиш шакли ва ўра ми

5 та 10 мл, 4 та 20 мл, 1 та 100 млдан шиша флаконларда ва 20 мл шиша флаконда дозатор-пуркагичли қопқоқ (спрей) билан ёпилган, давлат ва рус тилларидаги тиббиётда қўллаш бўйича йуриюмаси билан картон қутига жойланган.

Сақлаш шароити

Қуруқ, қоронги жойда, +2°C дан +15°C гача бўлган ҳароратда сақлансин. Препаратни болалар ололмайдиган жойда сақлаш керак ва уни яроқлилик мuddати ўтганидан кейин ишлатилмасин.

Яроқлилик мuddати

2 йил.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

«AZIYA IMMUNOPREPARAT» МДЖ,

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Юнус-Обод тумани, 17 даҳаси, саноат зонаси, шимолий қисми, №2 участкаси. Телефон +998712209144